

México [Cambiar de país](#)

La nueva era de la prescripción médica



Realizar otra búsqueda

Google ha cerrado el anuncio

[Generar un informe sobre este anuncio](#)
[Gestión anuncios ▶](#)

DACTIL[®] OB

SANOFI AVENTIS

Denominación genérica: Clorhidrato de piperidolato.

Forma farmacéutica y formulación: Comprimidos. Cada comprimido contiene: clorhidrato de piperidolato 100 mg. Excipiente cbp 1 comprimido

Indicaciones terapéuticas: Antiespasmódico. Por su acción espasmolítica y úterorrelajante, DACTIL[®] OB está indicado: como coadyuvante en el tratamiento de amenaza de aborto y de parto pretérmino. En el tratamiento de la dismenorrea.

Farmacocinética y farmacodinamia: El clorhidrato de piperidolato es una sustancia anticolinérgica con efectos periféricos semejantes a los de la atropina. Es un fármaco antimuscarínico terciario que inhibe el impulso nervioso parasimpático postganglionar. En dosis terapéuticas, el clorhidrato de piperidolato no bloquea los ganglios autónomos ni inhibe la transmisión hacia los músculos esqueléticos. Su uso clínico se basa en su capacidad de disminuir la motilidad del músculo liso. Por su potente acción espasmolítica, el clorhidrato de piperidolato inhibe las contracciones uterinas aumentadas prematuramente, devolviendo el tono de relajación al útero gestante. El clorhidrato de piperidolato, al igual que la atropina y la mayor parte de los medicamentos antimuscarínicos terciarios, es bien absorbido en el tracto gastrointestinal así como en la membrana conjuntival. Además, el fármaco se distribuye ampliamente después de su absorción.

Contraindicaciones: Al igual que otros fármacos anticolinérgicos, DACTIL[®] OB no debe administrarse a pacientes con: hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Glaucoma de ángulo estrecho, debido a que hay riesgo de crisis de glaucoma agudo por cierre del ángulo iridocorneal. Ileo paralítico, ya que puede agravarse. Taquicardia. Hipertiroidismo, por riesgo de descompensación cardíaca. Estenosis pilórica, debido a que puede haber riesgo de oclusión completa. Edema agudo de pulmón. Infarto del miocardio. Insuficiencia hepática severa, puesto que los efectos se aumentan y prolongan. Insuficiencia renal severa, ya que los efectos se aumentan y prolongan. Síndrome de Down. Adenoma prostático, por riesgo de retención urinaria aguda. Sujetos de edad avanzada. Niños.

Precauciones generales: La administración de clorhidrato de piperidolato a

Descarga nuestras apps en:



© 2014 Informed S.A de C.V. Carretera Picacho Ajusco No. 130 Desp. 103 Col. Jardines en la Montaña. Del. Tlalpan.
C.P. 14160

[¿Qué es P.R.Vademécum?](#) [Contacto](#) [Aviso de Privacidad](#)