



CIUDADANOS

PROFESIONALES

INFO CORPORATIVA

Portada

Servicio dermatología

Curas y tratamientos dermatológicos

Difenciprona para la alopecia areata

Quienes somos

Cartera de servicios

Actividad asistencial

Investigación

Información residentes

Sesiones

Protocolos

Educación para la salud

Galería fotográfica

Difenciprona para la alopecia areata

¿Qué es?

La Difenciprona es un potente sensibilizante sintetizado a partir de dibencilcetona. Es un producto de aplicación tópica que prácticamente no se absorbe y que no presenta capacidad mutagénica in vivo.

¿Cuándo se utiliza?

Se utiliza sobretodo en la alopecia areata y ocasionalmente en las verrugas víricas. Su mecanismo de acción se basa en la su capacidad inmunoreguladora, que produce una disminución de la inflamación de origen autoinmunitario que, en el caso de la alopecia areata, afecta al folículo piloso.

¿Cómo se utiliza?

Antes de empezar el tratamiento se tiene que realizar la sensibilización, que consiste en aplicar un parche de difenciprona al 2% durante 48 horas en la zona a tratar. A los 14 días se procede a testar la difenciprona en diferentes concentraciones para determinar cual es la concentración que produce el eczema al paciente.

Una vez determinada la concentración que produce el eczema, se procede a iniciar el tratamiento con difenciprona en esta concentración.

La difenciprona se aplica semanalmente. Se realizan pinceladas de toda la zona a tratar evitando lavar el pelo en las siguientes 48 horas. Es necesario protegerse durante la aplicación de la difenciprona, aplicándola con guantes, ya que hay que evitar una posible sensibilización de la persona que aplica el tratamiento.

La duración del tratamiento es variable pero puede durar hasta 9 meses. El crecimiento del pelo se ve en unas 12 semanas.

¿Cuáles son sus efectos secundarios?

La presencia de enrojecimiento, picor y descamación leves, los primeros 2-3 días, es un efecto deseable, ya que indica que hay una buena respuesta. Ocasionalmente pueden aparecer formas más severas de eczema (vesículas, ampollas).

A menudo se palpan ganglios linfáticos aumentados de tamaño (adenopatías) regionales, es decir, en las zonas de drenaje de las zonas tratadas. Son la consecuencia de la reacción inflamatoria que produce y se auto eliminan con el tiempo. En casos raros, pueden aparecer síntomas pseudo gripales.

¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta?

Dado que la difenciprona es una sustancia foto inestable, se recomienda no exponerse al sol durante las siguientes 48 horas después de la aplicación y proteger el envase del sol.

El proceso de sensibilización lo debe realizar el dermatólogo de referencia.

Compromiso social



Redes sociales



CONTACTO

Passeig Marítim 25-29 Barcelona 08003
Ver la situación en Google Maps
Tel: 93 248 30 00 · Fax: 93 248 32 54
webinfo@parcdesalutmar.cat

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut